

# Desinfektionsplan Nail-Studio

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Hygienische Händedesinfektion Händeschutz	vor jedem Kunde und nach ablegen der Einweghandschuhe bei sichtbarer Verschmutzung	Hände vollständig mit Präparat benetzen (ohne Wasser, Hohlhand gefüllt), 30 Sekunden lang feucht halten und Hände gegeneinander reiben. Entnahme des Desinfektionspräparates aus Direktspender. Danach bei Bedarf Handschuhe anlegen.	Curacid Poli gebrauchsfertig 30 Sek. Einmalhandschuhe	Kunde Michaela Dobrindt Michaela Dobrindt
	Händewaschung	bei Arbeitsbeginn vor Pausen nach Arbeitsende	Hände gründlich mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtüchern trocknen. Entnahme des Waschpräparates aus Direktspender.	Flüssigseife	Kunde Michaela Dobrindt
	Wundantiseptik	bei Bedarf	Hautareal vollständig benetzen, trocknen lassen oder mit benetztem Tupfer Haut abreiben.	octenisept® Wund-Desinfektion	Michaela Dobrindt
	Instrumenten desinfektion	sofort nach Gebrauch vor jeder Behandlung nach Arbeitsende	UVC Sterilisations einwirkzeit 3 Min  Schnelldesinfektion Aufbringen der Lösung, auf vollständige Benetzung achten, überschüssige Präparatmenge entfernen. wirksam gegen behüllte Viren inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV begrenzt viruzid gem. RKI	UVC Licht  mikrozid® AF liquid  Pefektan TB 1 % - 30 Min. 3 % - 15 Min	Michaela Dobrindt Michaela Dobrindt Michaela Dobrindt
	Kleine Flächen, Arbeitsflächen	nach jedem Kunde	Aufbringen der Lösung, auf vollständige Benetzung achten, überschüssige Präparatmenge entfernen.	mikrozid® AF liquid Schnelldesinfektion	Michaela Dobrindt
	Waschbecken, Toiletten: Brille, WC-Becken	nach sichtbarer Verschmutzung  Vor und nach Beendigung des Arbeitstages	Flächen mit getränktem Putztuch wischen, auf vollständige Benetzung achten, gut mit Wasser nachwischen.	Haushaltsreiniger	Michaela Dobrindt
	Große Flächen, Fußboden, Wände etc.	nach sichtbarer Kontamination  nach Beendigung des Arbeitstages	Flächen mit in Desinfektionsmittellösung getränktem Putztuch oder Mop wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Unigloves  1% = 5 min. 0,75% = 15 min. 0,50% = 30 min.	Michaela Dobrindt
	Normaler Abfall	Am Ende des Arbeitstages  bei Bedarf	Im verschlossenem Müllbeutel in Hausmüll Abfallbehälter leeren. Neue Abfalltüte einlegen.	Abfalleimer mit Müllbeutel	Michaela Dobrindt
	Einmalhandschuhe	Vor jedem Kunde	Handschuhe sind zu tragen: bei allen Tätigkeiten. Die Handschuhe sind jeder Behandlung zu entsorgen Das Tragen von Einmalhandschuhen entbindet nicht von der Pflicht zur hyg. Händedesinfektion.	Abfalleimer mit Müllbeutel	Michaela Dobrindt
	Mund-Nasenschutz	bei bestimmten Arbeiten	Anlegen/vorbinden  Der Atemschutz muss über Mund und Nase getragen werden. Er darf nicht vorübergehend heruntergezogen werden. Er muss nach Durchfeuchtung gewechselt werden und sofort in einen Abfallbehälter geworfen werden. Anschließend sind die Hände zu desinfizieren.	Hausmüll mit Müllbeutel	Michaela Dobrindt